

# Cómo hacer la prueba de Xilacina

## Guía del usuario IV

### Disminuya su Riesgo de Sobredosis

#### Ten Cuidado

- Ve despacio tomando cantidades más pequeñas
- Úsalo con personas de confianza e inyecte en diferentes momentos
- Tener Naloxona disponible y saber cómo usarla



### Paso 1: Prueba De Residuos De Cocina

#### Preparar Tiro


- Prepara tu inyección con normalidad y deja a un lado la aguja para probar tu sustancia sobrante en la olla antes de la inyección
- Agrega suficiente agua para llenar tu olla. Revuelva si es necesario



### Paso 2: Pruebas

#### Usar La Tira Reactiva



- Coloque la tira reactiva con el lado ondulado hacia abajo en el agua durante 15s. Asegúrese de que el agua esté a la altura de la línea
- Retire la tira del agua y colóquelo sobre una superficie plana durante 1-2 minutos



## Paso 3: Resultados

### Leer los Resultados

- Un **POSITIVO** en la prueba para fentanilo se indica por **UNA LÍNEA ROJA**
- Una prueba **NEGATIVO** para fentanilo se indica con **DOS LÍNEAS ROJAS**
- Recuerda, ninguna prueba es 100% precisa y una prueba negativa no significa necesariamente que estés a salvo



NOTA: Se debe considerar una prueba NEGATIVA aunque una segunda línea roja esté desvanecida o desmayada.

Si es posible, usa una prueba adicional para confirmar sus resultados